

# Covid-19 CONDUITES À TENIR EN CAS DE SUSPICION EN ENTREPRISE

## HORS MILIEU DE SOIN



Si symptômes évocateurs

Toux récente inhabituelle  
avec ou sans fièvre

OU

rhinite avec fièvre  
(T° > 38°C)

Possibilité aussi de céphalées, diarrhée, angine, syndrome grippal  
(courbatures, douleurs musculaires ou articulaires), troubles de l'odorat et du goût

**PERSONNE PRENANT EN CHARGE DANS L'ENTREPRISE**  
(Infirmier.e, par défaut SST, par défaut collègue)



> Port de masque chirurgical  
> Lavage de mains si possible

> Isolement autant que possible et orientation vers milieu de soin

**CAS SUSPECT**



> Port de masque chirurgical  
> Lavage de mains

> Maintenir autant que possible une distance minimum d'un mètre (éviter les gouttelettes)

Le lavage des mains doit se faire avec de l'eau et au savon, essuyer avec un papier à un usage unique. Par défaut avec une solution hydro-alcoolique.



Désinfecter le matériel et toutes zones de contact.  
Après intervention : Gestion des déchets sur circuit spécifique.



## -> ORIENTATION VERS LE MILIEU DE SOIN

Toux, fièvre, sans urgence médicale

Appeler  
Médecin  
traitant

En journée

Appeler  
116  
117

En permanence  
de soins

Détresse respiratoire,  
urgence médicale



Appeler  
SAMU  
15